

Hepatitis C

1. Májbetegség

- 80%-nál nincsenek semmilyen tünetek
- tünetek: láz, fáradtság, étvágytalanság, hányinger, hasi fájdalom, sötét vizelet, ízületi fájdalom, bőr és szemfehérje besárgul
- Külső környezeti és személyes tényezők, amelyek növelik a májbetegség kialakulásának kockázatát:
 - férfi nem
 - életkor a fertőzéskor > 40
 - alkoholfogyasztás > 20 g/nap (egy korsó sör)
 - dohányzás
 - együttes fertőzés HIV vagy Hepatitis B vírussal

2. Átadásának módjai!

- Kábítószer- használat az injekcióstű és fecskendő közös használata útján
- nem steril orvosi eszközök használata vagy újbóli használata, (különösen fecskendők és tűk) egészségügyi ellátás során
- vérátömlesztés nem ellenőrzött vérrel vagy vérkészítményekkel
- intranazális kábítószerrel használók és tetoválást vagy piercinget viselők
- A HCV szexuális úton is terjedhet és a fertőzött anya is átadhatja a magzatnak; ám ezek kevésbé jellemzőek
- A HCV **nem** terjed anyatej, étel, víz vagy fertőzött személlyel való érintkezés útján, pl.: ölelés, csók vagy étel/ital megosztása.

Fontos! A valószínűsíthető megfertőződéstől számítva 3 hónap múlva szűresd le magad. Eddig tart az ún. ablakperiódus, amikor még nem mutatható ki a fertőzöttség. Nagyon fontos, hogy mindig végeztess el megerősítő vizsgálatot, ami már teljesen biztos eredményt mutat!

3. A Hepatitis C fertőzés gyógyítható!

- A kezelés célja a gyógyulás
- A gyógyulás függ a vírus genotípusától és a kapott kezeléstől

-Interferon és ribavirin

- Injekciók hetente 24-48 héten át
- Gyógyulási arány: 40-70%-a a kezelt eseteknek
- Számos mellékhatás

- Új antivirális gyógyszerek, DAA

- Napi egy tablettát 12 héten át
- Gyógyulási arány > 90%
- Jobban tolerálja a szervezet
- Nagyon drága (TB finanszírozás feltétele!)